

## POIROT

Erbicid selectiv pentru combaterea postmergenta. a buruienilor cu frunza lata din culturile de cereale paioase

**Substanta activa:**

Tribenuron metil

Concentratie: 750 g/kg

**Formulare :** granule dispersabile in apa

**Omologat in Romania cu Certificatul de Omologare nr:**



GHS09 ATENȚIE

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P401: Depozitați departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale.

P501 Aruncați produsul / containerul în conformitate cu reglementările privind deșeurile periculoase

EUH 401: Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

NEINFLAMABIL

Representata de: ALITHINO LTD, CYPRUS

Producator: PROPLAN Plant Protection Co. S.L., SPANIA

CIECH Group a achizitionat 100% actiunile companie PROPLAN

**Lot nr.:**  
**Data fabricatiei:**  
**Contine:**

### MOD DE ACTIUNE

POIROT este un erbicid selectiv, sistemic, sulfonilureic, pentru controlul post-emergent al buruienilor cu frunza lata din culturile de grau si orz. Este absorbit prin frunze si radacini si este rapid translocat in intreaga planta, inhiba diviziunea celulara in varfurile de crestere ale lastarilor si radacinilor la buruienile sensibile. Cresterea buruienilor este oprita la cateva ore dupa aplicare, dar simptomele vizibile apar la 5-10 zile si moartea buruienilor are loc dupa 15-25 zile de la aplicare. Buruienile mai putn sensibile si cele aflate intr-un stadiu avansat de crestere este posibil sa nu moara, dar raman pitice si nu mai concureaza plantele de cultura in absorbtia apei si a nutrientilor. POIROT are eficacitate maxima cand este aplicat in faza de crestere activa a buruienilor.

### MOD DE INTREBUINTARE

#### **GRAU**

POIROT se aplica in primavara din stadiul de 2 frunze ale culturii pana la aparitia frunzei standard (intre BBCH 12 si BBCH 39), pentru combaterea buruienilor cu frunza lata, anuale in stadiul optim de 2-4 frunze si pe jene in stadiul optim de rozeta.

**Doza recomandata:** 15-20 g/ha in functie de momentul efectiv al aplicarii si buruienile de combatut. Astfel se aplica 15-20 g/ha pentru combaterea buruienilor mediu sensibile sau cand buruienile sensibile au depasit stadiul de 3-4 frunze. Pentru combaterea buruienilor sensibile in stadiul optim, se recomanda doza de 15g/ha. Este esentiala acoperirea integrala a foliajului cu suspensia de stropit.

#### **ORZ**

**Doza recomandata:** 10-15 g/ha. Pentru combaterea buruienilor sensibile in stadiul optim, se aplica 10 g/ha.

**Volumul de suspensie** la aplicarea terestra 200-400 l/ha (2-4l/100 m.p.); la aplicarea aeriana 30-50 l/ha.

**Numarul maxim de tratamente pe an:** 1.

**Timp de pauza:** de la aplicare pana la recoltare nu raman reziduuri in recolta, Nu se trateaza mai tarziu de frunza standard.

### PREPARAREA SUSPENSIEI DE STROPIT

Turnati cantitatea necesara de POIROT in rezervorul masinii pe jurnatate umplut cu apa, cu agitatorul actionand pana cand produsul este complet dispersat. Continuati agitarea in timp ce se umple rezervorul cu apa, Se continua agitarea solutiei pe tot parcursul stropirii. Asigurati-va ca echipamentul de stropit este curat si in buna stare de functionare. Inaintea stropirii este necesara calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformitatii.

Preparati numai cantitatea de solutie necesara pentru stropire curenta

Folositi solutia imediat dupa preparare.

Controlati periodic starea echipamentului de stropit.

### COMPATIBILITATE

POIROT poate fi amestecat cu alte erbicide si cu majoritatea fungicidelor. In combinatie cu alte produse omologate se respecta cu strictete recomandarile partenerului. Pentru combaterea buruienilor graminee, POIROT se poate amesteca in rezervorul masinii cu graminicide omologate la doza lor intrega.

### **PREVENIREA DERIVEI**

Luati toate masurile posibile pentru a evita deriva solutiei de stropit. Evitati deriva solutiei de stropit pe culturile alaturate sensibile precum sfecla pentru zahar, rapita, legumele, cartoful, pe suprafetele ce urmeaza a fi cultivate, sau cursurile de apa, Nu stropiti cand viteza vantului depaseste 15 km/ora. Potentialul derivei creste la temperatura ridicata, pe timp de seceta si umiditate relativa scazuta. Trebuie acordata prudenta maxima indiferent de viteza vantului, Nu tratati in conditii de inversie termica constand in curenti de aer ascendenti si cresterea temperaturii aerului cu inaltimea. Evitati pulverizarea sau manipularea produsului la distanta mai mica de 20 m de bunuri, guri de drenaj, canalizare deschisa sau locuri unde apa de ploaie scursa din campul tratat ajunge in cursuri de apa temporare sau permanente. Nu stropiti la distanta mai mica de 20 m de rezervoare naturale sau artificiale de apa.

### **SELECTIVITATE**

Oaca POIROT este utilizat conform prezentelor instructiuni si la doza recomandata, produsul nu este fitotoxic.

### **MASURI DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII**

La manipularea/utilizarea produsului POIROT, totdeauna purtati salopeta, ochelari de protectie, manusi din cauciuc (cauciuc butilic sau nitrilic), cizme de cauciuc. Folositi numai echipament de protectie omologate. La incarcare folositi sorturi din PVC sau cauciucate. Daca va simtiti rau chernati imediat doctorul si aratati eticheta.

Respectati urmatoarele masuri de siguranta :

- Este interzis rncatul, bautul sau fumatul in timpul lucrului. Spalati-va bine inaintea meselor si intodeauna dupa terminarea lucrului.
  - Nu inhalati vapori sau ceata (aerosoli) proveniti din pulverizare.
  - Este obligatorie folosirea echipamentului de protectie in timpul lucrului: manusi, ochelari, costum de protectie:
  - Nu aplicati acest prod us intr-un mod in care apare pericolul contammarf lucratorilor sau altor persoane, direct sau prin derlva,
  - Folositi echipament de protectie, personal.
  - Nu deversati accidental produsul in apele de supratata sau in sistemul sanitar de canalizare.
  - Curatati imediat produsul prin aspirare sau maturare si puneti intr-un container adecvat pentru reziduuri
- Cereti asistenta unui specialist, daca este necesar

### **PRIMUL AJUTOR**

In caz de ingestie admnlstratt aproximativ 0,5 l apa calduta cu cateva tablete de carbune activ si cereti asistenta medicului sa Induca voma sau sa faca spalaturi stomacale. Nu adrnlnstrati nlciodata nimic pe cale orala unei persoane in stare de lesin, Cereti totdeauna ajutorul medicului.

In caz de contact cu pielea, spalati cu sapun si multa apa si schimbati hainele.

In cazul contactului cu ochii spalati imediat cu multa apa (15 minute) si consultati specialistul daca iritatie persista.

In caz de inhalare scoateti accidentatul la aer curat. Adrnlnstraf oxigen sau respiratie artificiala daca este necesar. Consultati medicul dupa o expunere semnificativa.

In cazul orlcarei expuneri cereti ajutorul medicului si prezentati eticheta daca este posibil.

Pentru informnatiil medicale suplimentare, contactaf Institutul de Sanatate Publica din Bucuresti (telefon de urgenta 021 3183620).

### **CONDITII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT**

POIROT, trebuie transportat si depozitat in ambalaj original in locuri uscate si reci, departe de spatii locuite, destinate in exclusivitate pentru pesticide la care au acces numai persoanele autorizate, fara actiunea directa a razelor solare si a caldurii, separat de alimente si furaje.

In timpul transportului produsul va fi protejat de intemperii si caldura.

Pe timpul manipularii transportului si depozitarii se vor lua toate masurile de protectie a muncii, PSI, etc.

Pastrati produsele incuiate si nu le lasati la indernana copiilor;

In caz de imprastiere, strangeti produsul si resturile.

Deseunile rezultate din folosirea acestui produs pot fi pastrate numai in locuri special amenajate, conform legislatiei in vigoare.

**IN ATENTIA UTILIZATORULUI**

POIROT , trebuie folosit numai respectand recomandările date in prezenta eticheta,

**Termen de valabilitate:** produsul este valabil 2 ani de la data fabricatiei